

Übersichtstabelle Ackerfuchsschwanz-Mittel Getreide Herbst 2015

Produkt	Wirkstoffgr. nach HRAC	AWM je ha	Blatt	Boden	Idealer Einsatz- zeitpunkt	Wirkung auf Afu	ca. ha Preis	Resistenz- gefahr	Herbstanw. empfohlen	Bemerkungen
			Wirkung in %							
Axial	A	0,9 l	100	-	ab 2-Blatt Afu	++	30 €	hoch	nein	möglichst nicht im Herbst anwenden, quasi Joker für Nachbehandlungen im Frühjahr
Arelon Top (IPU)	C	3 l	30	70	ES 10 – 13	+(+)	16 €	mittel	ja, 1 x pro FF	im Herbst nicht auf drainierte Flächen, ab 30% Tongehalt immer unerlaubt.
Lentipur (CTU)	C	3 l	20	80	ES 10 – 13	+(+)	22 €	mittel	ja, 1 x pro FF	im Herbst nicht auf drainierte Flächen, stärkere Unkrautwirkung als IPU, in WW Sortenverträglichkeit!
Atlantis WG	B	0,3 kg + 0,6 l	80	20	ab 2-Blatt Afu	+++	38 €	mittel – hoch	nein	möglichst nicht im Herbst anwenden, quasi Joker für Nachbehandlungen im Frühjahr
Lexus	B	20 g	50	50	ab ES 11	++	23 €	mittel – hoch	bedingt	bei Gefahr von resistentem Afu keine Herbstanwendung
Absolute M	B	180 g	45	55	ab ES 11	++	30 €	mittel – hoch	bedingt	wie Lexus, nur mit Diflufenican, Ciral sehr ähnlich, jeweils breitere Unkrautwirkung
Boxer	N	5 l	10	90	ES 00	+(+)	40 €	keine	ja	Resistenzbrecher, in Mischungen 3 l. Nicht mit IPU/CTU
Stomp/Acivus	K	4 l	30	70	ES 00	+(+)	45 €	sehr gering	ja	nur in Mischungen, dann mit 2,5 – 3 l
Malibu	K	4 l	20	80	ES 00	+++	61 €	sehr gering	ja	je früher, desto sicherer, stärkstes Solo-Produkt mit Bodenwirkung
Herold	K	0,6 l	10	90	ES 00	++(+)	53 €	sehr gering	ja	je früher, desto sicherer
Cadou forte Set	K	0,3 + 0,75 l	10	90	ES 00	++(+)	58 €	sehr gering	ja	je früher, desto sicherer
Trinity	K,C	2 l	40	60	ab ES 11	+	27 €	gering	ja	Mischpartner, sehr breite Unkrautwirkung, nicht mit Boxer oder Axial
Alliance	B	60 g	40	60	ab ES 10	(+)	14 €	mittel – hoch	ja	Mischpartner, sehr breite Unkrautwirkung
Beflex	F	0,5 l	25	75	ab ES 10	-	21 €	gering	ja	Mischpartner bei TRESPE!

Hinweise:

- Malibu, Cadou forte Set und Herold haben bei voller Awm je 240 g Flufenacet (früher Cadou, nur noch im Pack mit Bacara). Dies ist der stärkste Afu-Bodenwirkstoff im Markt!
- Sichere Wirkung nur im VA bei feinkrümeligen Böden ohne Auflage von organischer Masse (Stroh, Aufwuchs...)! Nebenwirkung auf Trespel!
- Boxer als Mischpartner bei drohender Fuchsschwanz-Resistenz unbedingt mit 3 l einplanen! Stärkste Klettenwirkung über Boden.
- Wirkstoffgruppen A und B im Herbst unbedingt meiden, da alle blattaktiven Fuchsschwanz-Präparate für den Frühjahr (Axial, Ralon, Lexus, Atlantis, Broadway, ...) **NUR** aus diesen Gruppen sind!
- Bei starkem Fuchsschwanz-Druck und/oder Trepsen Fröhsaaten vermeiden, Pflug einsetzen oder sehr viel mehr Geld für nicht mehr sichere chemische Bekämpfung ausgeben!
- Alle erlaubten Präparate möglichst im Voraufbau (VA) einsetzen, da dort höchste Wirkungspotenz!
- Bei Soloanwendungen niemals AWM reduzieren! Resistenzgefahr!
- Getreidebestände, die zu frühem und normalem Termin gesät wurden unbedingt behandeln, da sonst Afu bis Frühjahr zu kräftig für sichere Bekämpfung werden kann!

Anwendungsvorschläge:

Malibu	4 l	im Stadium 00, also im Voraufbau, bei „normalem“ Afu-Druck
Herold + Boxer	0,6 + 3 l	im Stadium 00, also im Voraufbau, bei hohem Afu-Druck
Herold + Malibu + Beflex	0,6 + 2 + 0,5 l	im Stadium 11 bei Trespdruck in WG – noch sinnvoller Pflug-Einsatz oder WW bauen, da nur begrenzte Trespel-Wirkung
Absolute M + Boxer	180 g + 3 l	im Stadium 11 bei mittlerem Afu-Druck ohne Resistenzgefahr, nur in WW, WT
Filon Pack (Boxer + Alliance)	3 l + 60 g	im Stadium 10 - 11 bei geringem Fuchsschwanzdruck mit möglicher Nachbehandlung Axial im Frühjahr

Für weitere fachliche Diskussionen stehen wir gerne zur Verfügung!